


注意!

感染力が極めて高い

麻疹(はしか)

感染拡大しています



症状

感染約 10 日後に発熱や咳などの風邪症状が現れ、2～3日熱が続いた後、**39 度以上の高熱と発しん**が出現します。

感染経路

空気感染等によりヒトからヒトへの**感染力は非常に強い**です。発症日の1日前から解熱後3日間まで感染力があります。



皆様へのお願い

- ・ 麻疹を疑う**症状がある場合、外出を控え、受診する際には事前に医療機関に電話し、なるべく公共交通機関の利用を避けてください。**
- ・ 麻疹の感染拡大防止のため、接触者等への**行政による調査にご協力**ください。
- ・ お子様が**1歳または就学前1年間**にある場合、積極的に早期の接種をご検討ください。
- ・ 定期接種の**接種歴を確認**いただき、**2回のワクチン接種の検討***をお願いします。
※今回の流行の中心である10～40代の方は特にご検討ください。
- ・ 妊娠中に感染すると早産や流産のリスクがあるため、**妊娠前の接種を検討**ください。
- ・ **免疫不全のある方**は、主治医の方と相談の上、**接種を検討**ください。
- ・ **乳幼児**は、肺炎や脳炎を起こすリスクがあるため、**家族の接種歴を確認**ください。

詳しくは、厚生労働省WEBページをご覧ください

 **厚生労働省**

感染症対策課 2026年4月 作成

